

# Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АДС - анатоксин)

**Цель:** применяется для профилактики дифтерии и столбняка у детей.

**Способ применения:** внутримышечное введение препарата в передне-наружную часть бедра.

**Побочное действие:** частота развития: Очень частые - 1/10 назначений (,). Частые - 1/100 назначений (, но < 10%). Нечастые - 1/1000 назначений (, но < 1%). Редкие - 1/10000 назначений (, но < 0,1%). Очень редкие - <1/10000 назначений, включая отдельные случаи

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Недомогание, повышение температуры тела, болезненность, гиперемия, отечность            | Нечасто     |
| Аллергические реакции (отек Квинке, крапивница, полиморфная сыпь, анафилактический шок) | Очень редко |

## Противопоказания:

- сильная реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущее введение препарата;
- острые инфекционные или неинфекционные заболевания – прививки проводят через 2-4 недели после выздоровления. При легких формах заболеваний (ринит, легкая гиперемия зева и т.п.) прививка допускается после исчезновения клинических симптомов;
- хронические заболевания – прививки проводят по достижению полной или частичной ремиссии, в том числе на фоне поддерживающего лечения (кроме иммуносупрессивного);
- прогрессирующие заболевания нервной системы, афебрильные судороги в анамнезе – прививают после исключения прогрессирования процесса;

**Возможные варианты медицинского вмешательства:** пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, внутримышечная инъекция.

**Результат:** Формирование специфического антитоксического иммунитета против дифтерии и столбняка

## Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.