

Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена жидкий (АДС-М-анатоксин)

Цель: применяется для профилактики дифтерии и столбняка у детей, подростков и взрослых.

Способ применения: внутримышечное введение препарата в передне-наружную часть бедра или глубоко подкожно (подросткам и взрослым) в подлопаточную область.

Побочное действие: частота развития: Очень частые - 1/10 назначений (,). Частые - 1/100 назначений (, но < 10%). Нечастые - 1/1000 назначений (, но < 1%). Редкие - 1/10000 назначений (, но < 0,1%). Очень редкие - <1/10000 назначений, включая отдельные случаи

Головная боль	Не часто
Недомогание, повышение температуры тела	Не часто
Болезненность, гиперемия, инфильтрат, отечность в месте вакцинации	Не часто
Тонические/клонические судороги, гиперсаливация	Очень редко
Аллергические реакции (отек Квинке, крапивница, полиморфная сыпь, анафилактический шок)	Очень редко

Противопоказания:

- сильная реакция (температура выше 40°C, отек и гиперемия свыше 8 см в диаметре в месте введения) или поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, энцефалит или энцефалопатия, судорожный синдром и т.д.) на предыдущее введение препарата;
- острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – прививки проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При не тяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях прививки проводятся после нормализации температуры;
- неврологические изменения – прививают после исключения прогрессирования процесса;
- аллергические заболевания – прививки проводят через 2-4 недели после окончания обострения, при этом стабильные проявления заболевания (локализованные кожные проявления, скрытый бронхоспазм и т.п.) не являются противопоказаниями к вакцинации, которая может быть проведена на фоне соответствующей терапии;

Возможные варианты медицинского вмешательства: пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, внутримышечная или подкожная инъекция.

Результат: создание в организме активного искусственного иммунитета против возбудителей дифтерии и столбняка.

Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.