

АЛЬГАВАК М

Вакцина для профилактики вирусного гепатита А

Цель: вакцина для профилактики вирусного гепатита А у взрослых и детей с 3-х лет.

Способ применения: внутримышечное введение препарата в область дельтовидной мышцы (область плеча).

Побочное действие: частота развития: Очень частые - 1/10 назначений (,). Частые - 1/100 назначений (, но < 10%). Нечастые - 1/1000 назначений (, но < 1%). Редкие - 1/10000 назначений (, но < 0,1%). Очень редкие - <1/10000 назначений.

Болезненность и гиперемия кожи в месте инъекции	очень часто
Головная боль, головокружение, повышение температуры выше 37°C, слабо выраженный инфильтрат в месте инъекции	часто
Подергивание мышц в месте инъекции	очень редко

Противопоказания:

- сильная реакция (температура выше 40°C, в месте введения вакцины отек и гиперемия свыше 8 см в диаметре) или гиперчувствительность на предыдущее введение вакцины Альгавак М;
- повышенная чувствительность к любому из компонентов вакцины;
- острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний являются временным противопоказанием для проведения прививок. При не тяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях прививки проводятся после нормализации температуры;
- детский возраст до 3-х лет;

Возможные варианты медицинского вмешательства: пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, внутримышечная инъекция.

Результат: выработка антител и создание длительного напряженного иммунитета к вирусу Гепатита А.

Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.