

МЕНАКТРА

Вакцина менингококковая полисахаридная (серогрупп А, С, Y и W - 135), конъюгированная с дифтерийным анатоксином

Цель: Профилактика инвазивной менингококковой инфекции, вызываемой *N. Meningitides* серогрупп А, С, Y и W -135 у лиц в возрасте от 9 месяцев до 55 лет.

Способ применения: внутримышечное введение в переднебоковую область бедра (детям в возрасте от 9 до 12 месяцев) или в дельтовидную мышцу плеча (детям в возрасте от 12 месяцев и старше).

Побочное действие: частота развития: Очень часто - 1/10 назначений. Часто - 1/100 назначений (но < 10%). Нечасто - 1/1000 назначений (но < 1%). Редко - 1/10000 назначений (но < 0,1%). Очень редко - <1/10000 назначений. Большая часть общих и местных реакций наблюдаются в течении первых 7 дней после вакцинации, протекают легко и продолжаются менее 3-х суток.

дети в возрасте от 9 до 18 месяцев	
потеря аппетита, сонливость	очень часто
рвота	часто
болезненность, эритема и отек в месте инъекции, раздражительность, аномальный плач, лихорадка	очень часто
дети в возрасте от 2 до 10 лет	
снижение аппетита, сонливость	очень часто или часто
диарея	очень часто
рвота	часто
сыпь, крапивница	часто
артралгия	часто
болезненность и уплотнение в месте инъекции	очень часто
раздражительность, лихорадка, покраснение и отек в месте инъекции	очень часто или часто
дети в возрасте от 11 до 18 лет	
снижение аппетита	очень часто или часто
головная боль	очень часто
диарея	очень часто или часто
рвота	часто
сыпь	часто
артралгия	очень часто
боль, покраснение, уплотнение и отек в месте инъекции, повышенная утомляемость, общее недомогание	очень часто
озноб, лихорадка	часто

Противопоказания:

- известная гиперчувствительность с системными проявлениями к любому компоненту вакцины, включая дифтерийный анатоксин, или на предыдущее введение других вакцин, включающих те же компоненты;
- острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят после выздоровления или в стадии ремиссии);

Возможные варианты медицинского вмешательства: пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, внутримышечная инъекция.

Результат: выработка специфических антител против капсулярных полисахаридов серогрупп возбудителя менингококковой инфекции, входящих в вакцину (А, С, Y и W -135), которые обладают бактерицидной активностью.

Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.