

ПЕНТАКСИМ

Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная и инфекций, вызываемых *Haemophilus influenza* тип b, конъюгированная.

Цель: активная иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инвазивных инфекций, вызываемых *Haemophilus influenza* тип b (менингит, септицемия, гнойное воспаление подкожной клетчатки, артрит, эпиглоттит, пневмония, остеомиелит и др.). Проведение первичной вакцинации детям с возраста 2 месяцев и ревакцинации детям в возрасте 1,5 лет.

Способ применения: внутримышечное введение препарата, детям в возрасте от 3 до 24 месяцев - средняя треть переднелатеральной поверхности бедра, детям в возрасте старше 24 месяцев - в дельтовидную мышцу плеча.

Побочное действие: частота развития: Очень частые - 1/10 назначений. Частые - 1/100 назначений (, но < 10%). Нечастые - 1/1000 назначений (, но < 1%). Редкие - 1/10000 назначений (, но < 0,1%). Очень редкие - <1/10000 назначений, включая отдельные случаи

Раздражительность, нервозность, необычный плач	очень часто
Покраснение, болезненность и отек в месте инъекции, Лихорадка >38° С	очень часто
Уплотнение в месте инъекции	часто
Покраснение и отек в месте инъекции > 5 см, лихорадка >39° С	нечасто
Лихорадка >40° С, диффузный отек конечности	редко, возникает при введении вакцины, содержащей капсульный полисахарид <i>Haemophilus influenza</i> тип b
Длительный плач	нечасто
Нарушение сна	часто
Анорексия	очень часто
Сонливость	очень часто
Рвота	очень часто
Диарея	часто

Развиваются в течение 48 часов после вакцинации и проходят самопроизвольно, не требуя специфического лечения.

Противопоказания:

- установленная реакция гиперчувствительности к любому компоненту вакцины, а также к глутаральдегиду, неомицину, стрептомицину и полимиксину В, или к коклюшным вакцинам (ацеллюлярным или цельноклеточным);
- сильная реакция, развившаяся в течение 48 часов после предыдущей иммунизации вакциной, содержащей коклюшный компонент (температура тела равна или >40°С, отек или гиперемия свыше 8 см в диаметре в месте введения вакцины, синдром длительного необычного плача, фебрильные и афебрильные судороги, гипотонический-гипореактивный синдром;

- повышение температуры тела при остром инфекционном или обострении хронического заболевания. При нетяжелом течении ОРВИ и ОКИ прививки проводят сразу после нормализации температуры;
- прогрессирующая энцефалопатия;
- Энцефалопатия, развившаяся в течение 7 дней после введения любой вакцины содержащей антигена Bordetella pertussis.

Возможные варианты медицинского вмешательства: пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, внутримышечная инъекция.

Результат: Создание в организме активного искусственного иммунитета против возбудителей коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита.

Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.