

ПолиовакСин

Вакцина полиомиелитная культуральная очищенная концентрированная инактивированная жидкая из аттенуированных штаммов Сэбина

Цель: применяется для профилактики полиомиелита у детей.

Способ применения: внутримышечное введение препарата, детям в возрасте до 2 лет – вакцину вводят в переднебоковую область бедра, детям в возрасте старше 2 лет - в дельтовидную мышцу плеча.

Побочное действие: частота развития: Очень частые - 1/10 назначений. Частые - 1/100 назначений (, но < 10%). Нечастые - 1/1000 назначений (, но < 1%). Редкие - 1/10000 назначений (, но < 0,1%). Очень редкие - <1/10000 назначений. По данным клинических исследований:

Болезненность в месте инъекции	очень часто
Покраснение (гиперемия) в месте инъекции	часто
Отек уплотнение (инфильтрат) в месте инъекции, преходящее нарушение двигательной активности конечности, повышение температуры тела	нечасто
Лихорадка в первые 24-48 часов после вакцинации	частота неизвестна
Возбуждение, сонливость, раздражительность, патологический плач	частота неизвестна
Кратковременные фебрильные судороги в первые несколько дней, головная боль, слабая преходящая парестезия в конечностях в первые 2 недели после вакцинации, полинейропатия	частота неизвестна
Сыпь, крапивница, отек, болезненность, гиперемия в месте инъекции, сохраняющиеся 1-2 дня	частота неизвестна
Аллергические реакции, анафилактический шок	частота неизвестна
Преходящая артралгия, миалгия, преходящее нарушение двигательной активности конечности	частота неизвестна
Лимфаденопатия	частота неизвестна

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
- реакция повышенной чувствительности на предшествующее введение препарата, (температура >40°C, отек и гиперемия в месте введения свыше 8 см в диаметре) или осложнение на предыдущее введение препарата;
- заболевание, сопровождающееся лихорадкой, острое инфекционное или хроническое заболевание в стадии обострения. При нетяжелом течении ОРВИ и ОКИ прививки проводят сразу после нормализации температуры;
- гипотрофия 3 степени, вакцинацию проводят при нормализации веса.
- периоперационный период, не ранее чем через 3-4 недели после операции, и не позднее чем за 1 месяц до операции;

Возможные варианты медицинского вмешательства: пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, внутримышечная инъекция.

Результат: Создание в организме специфического иммунитета против вирусов полиомиелита 1, 2, 3 типов.

Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.