

ПРЕВЕНАР-13

Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная

Цель: Профилактика заболеваний, вызываемых *Streptococcus pneumoniae* серотипов 1, 3, 4, 5, 6А, 6В, 7F, 9V, 14, 18С, 19А, 19F и 23F (включая бактериемию, сепсис, менингит, пневмонию и острый средний отит) у детей в возрасте 2 месяцев до 5 лет.

Способ применения: внутримышечное введение в переднебоковую поверхность бедра (детям до 2-х лет) или в дельтовидную мышцу плеча (лицам старше 2-х лет).

Побочное действие: частота развития: Очень часто - 1/10 назначений. Часто - 1/100 назначений (но < 10%). Нечасто - 1/1000 назначений (но < 1%). Редко - 1/10000 назначений (но < 0,1%). Очень редко - <1/10000 назначений.

гипертермия до 39° С, раздражительность, гиперемия кожи, болезненные ощущения, уплотнение или отек размером 2,5-7,0 см в месте инъекции, сонливость, ухудшение сна	очень часто
гипертермия выше 39° С, болезненность в месте инъекции, приводящая к кратковременному ограничению объема движений конечности	часто
гиперемия кожи, уплотнение или отек размерами более 7 см в месте инъекции, плаксивость	нечасто
случаи гипотонического коллапса, реакции гиперчувствительности в месте инъекции (крапивница, дерматит, зуд)	редко
регионарная лимфаденопатия	очень редко
реакция гиперчувствительности, включая одышку, бронхоспазм, отек Квинке разной локализации, анафилактическая/анафилactoидная реакции, включая шок	редко
судороги, в том числе фебрильные	редко
снижение аппетита	очень часто
рвота, диарея	нечасто
сыпь, крапивница	редко
полиморфная эритема	очень редко

Противопоказания:

- повышенная чувствительность на предшествующее введение Превенар-13 или Превенар (в том числе анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции);
- повышенная чувствительность к дифтерийному анатоксину и/или вспомогательным веществам;
- острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;

Возможные варианты медицинского вмешательства: пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, внутримышечная инъекция.

Результат: выработка антител к капсулярным полисахаридам *Streptococcus pneumoniae*, обеспечение специфической защиты от инфекций, вызываемых включенными в вакцину 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F и 23F серотипами пневмококка.

Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.