

Проба Манту (Туберкулин)

Цель: проводится в целях раннего выявления туберкулеза у детей.

Метод: внутрикожное введение очищенного туберкулина в стандартном разведении.

Побочное действие: частота развития: Очень частые - 1/10 назначений (). Частые - 1/100 назначений (, но < 10%). Нечастые - 1/1000 назначений (, но < 1%). Редкие - 1/10000 назначений (, но < 0,1%).

Головная боль	Не часто
Головокружение, потеря сознания	Редко
Боль в грудной клетке	Редко
Боль в животе, тошнота, рвота	Редко
Мышечные спазмы	Редко
Боль в месте вакцинации	Часто
Астения, некроз	Редко
Недомогание, повышение температуры тела	Не часто

Противопоказания:

- Повышенная чувствительность к действующему веществу и/или к любому другому компоненту, входящему в состав препарата;
- Распространенные кожные заболевания;
- Острые, хронические инфекционные и соматические заболевания в период обострения;
- Аллергические состояния (бронхиальная астма, идиосинкразии с выраженными кожными проявлениями в период обострения);
- Ревматизм в острой и подострой фазах;
- Эпилепсия.

Возможные варианты медицинского вмешательства: пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, внутрикожная инъекция и оценка пробы, путем измерения линейкой.

Результат: пробы Манту оценивает врач или специально обученная медсестра через 72 часа после их постановки, путем измерения реакции в мм. По итогам оценки пробы принимается решение о необходимости вакцинации и ревакцинации ребенка или направления на консультацию к фтизиатру.

Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.