

ВАКТРИВИР

Комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита культуральная живая

Цель: Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита у лиц, начиная с возраста 12 месяцев.

Способ применения: подкожное введение препарата под лопатку или в область плеча (на границе между нижней и средней третью с наружной стороны).

Побочное действие: частота развития: Очень часто - 1/10 назначений. Часто - 1/100 назначений (но < 10%). Нечасто - 1/1000 назначений (но < 1%). Редко - 1/10000 назначений (но < 0,1%). Очень редко - <1/10000 назначений, включая отдельные случаи.

Кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5° С, катаральные явления со стороны носоглотки (гиперемия зева, ринит). В течение первых 18 суток после вакцинации.	часто
Местная реакция в первые 48 часов (гиперемия, кожи), проходит без лечения через 1-3 суток	часто
В течение первых 18 суток после вакцинации – недомогание, продолжающееся 1-3 суток	нечасто
В первые 48 часов – местная реакция, (выражающаяся в слабовыраженном отеке в месте введения вакцины, которая проходит без лечения через 1-3 суток	редко
Беспокойство, вялость, нарушение сна	редко
Аллергические реакции в первые 24-48 часов у лиц с измененной реактивностью	очень редко
Лимфоаденопатия (увеличение преимущественно затылочных и заднешейных лимфоузлов	редко
С 5 по 18 сутки – сыпь, продолжающаяся 1-3 суток	нечасто
Тромбоцитопеническая пурпура	очень редко
Транзиторная полинейропатия	очень редко
Судорожные реакции на фоне высокой температуры, возникающие после прививки на 6-10 сутки	очень редко
Артралгия, возникающая в интервале между 10 и 15 сутками после вакцинации	редко
Преходящий артрит, возникающая на 10 и 15 сутки после вакцинации	редко
Боли в животе, абдоминальный синдром	очень редко
Кашель	нечасто
Кратковременное незначительное увеличение околоушных слюнных желез. Возникает с 5 по 42 сутки, продолжительность 2-3 суток.	редко
С 5 по 18 сутки – конъюнктивит, продолжающийся 1-3 суток	нечасто
Болезненный кратковременный отек яичек	очень редко

Противопоказания:

- анафилактические реакции или тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды (гентамицина сульфат), куриные и/или перепелиные яйца;
- гиперчувствительность к любому из компонентов вакцины;
- первичные и приобретенные иммунодефицитные состояния;
- злокачественные заболевания крови и новообразования;

- сильная реакция (подъем температуры выше 40°C, отек и/или гиперемия свыше 8 см в диаметре в месте введения) или осложнение на предыдущее введение вакцин для профилактики кори, паротита, краснухи;
- Острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях прививки проводят после нормализации температуры;

Возможные варианты медицинского вмешательства: пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, подкожная инъекция.

Результат: выработка организмом антител к вирусам кори, эпидемического паротита и краснухи.

Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.