

## Вакцина паротитная культуральная живая

**Цель:** Профилактика эпидемического паротита, начиная с возраста 12 месяцев.

**Способ применения:** подкожное введение препарата под лопатку или в область плеча (на границе между нижней и средней третью с наружной стороны).

**Побочное действие:** частота развития: Частые - 1/100 назначений (, но < 10%). Нечастые - 1/1000 назначений (, но < 1%). Редкие - 1/10000 назначений (, но < 0,1%). Очень редкие - <1/10000 назначений.

|                                                                                                                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Кратковременное, незначительное повышение температуры тела, катаральные явления со стороны носоглотки (гиперемия зева, ринит). Появляется с 5 по 15 сутки после вакцинации. | часто       |
| Покашливание, конъюнктивит, кореподобная сыпь. Возникает с 5 - по 18 сутки, продолжительность до 3-х суток                                                                  | нечасто     |
| Местная реакция в первые 48 часов (гиперемия, слабо выраженный отек), проходит без лечения                                                                                  | редко       |
| Кратковременное незначительное увеличение околоушных слюнных желез. Возникает с 5 по 42 сутки, продолжительность 2-3 суток.                                                 | редко       |
| Беспокойство, вялость, нарушение сна                                                                                                                                        | редко       |
| Аллергические реакции в первые 24-48 часов                                                                                                                                  | очень редко |
| Судорожные реакции на фоне высокой температуры (6-10 сутки)                                                                                                                 | очень редко |
| Боли в животе, абдоминальный синдром                                                                                                                                        | очень редко |
| Болезненный кратковременный отек яичек                                                                                                                                      | очень редко |

### Противопоказания:

- анафилактические реакции или тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды (гентамицина сульфат), куриные и/или перепелиные яйца;
- первичные иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови и новообразования;
- сильная реакция (подъем температуры выше 40°C, отек и/или гиперемия свыше 8 см в диаметре в месте введения) или осложнение на предыдущее введение паротитной или коревой вакцин;
- острые заболевания или обострение хронических заболеваний

**Возможные варианты медицинского вмешательства:** пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, подкожная инъекция.

**Результат:** выработка организмом антител к вирусам эпидемического паротита у детей.

### Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.