

Вакцина против краснухи культуральная живая аттенуированная

Цель: Профилактика краснухи, начиная с возраста 12 месяцев.

Способ применения: подкожное введение препарата в область плеча.

Побочное действие: частота развития: Иногда - 1/1000 назначений (, но < 1%). Редкие - 1/10000 назначений (, но < 0,1%). Очень редкие - <1/10000 назначений.

Кратковременная гиперемия , отек и уплотнение, сопровождающееся болезненностью	иногда
Кожная сыпь (в виде мелких розеол или фиолетовых пятен различного размера)	редко
Кратковременное повышение температуры до субфебрильных величин, более высокая температура у отдельных привитых	редко
Лимфаденопатия (увеличение преимущественно затылочных и заднешейных лимфоузлов)	редко
Кашель, насморк, недомогание, головная боль	редко
Тошнота	редко
Артралгия (в коленных и лучезапястных суставах (может возникать на 10-15 сутки после вакцинации)	редко
Преходящий артрит с выпотом в полость сустава и без него	редко
Транзиторная полинейропатия	очень редко
Тромбоцитопеническая пурпура	очень редко

Противопоказания:

- иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови и новообразования;
- сильная реакция (подъем температуры выше 40°C, отек и/или гиперемия свыше 8 см в диаметре в месте введения) или осложнение на предыдущую дозу;
- острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Возможные варианты медицинского вмешательства: пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, подкожная инъекция.

Результат: выработка организмом антител к вирусам краснухи у детей.

Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.